

un cancer du sein chez la femme **enceinte** ou **allaitante**

ÉPIDÉMIOLOGIE



de **30** à **35** ans

L'incidence du cancer du sein chez les femmes commence à **augmenter**

de **35** à **40** ans

**AUGMENTATION
NETTE**



500
femmes par
an



21
SA



33
ANS

**CONCERNÉES EN FRANCE PAR
UN CANCER DU SEIN LIÉ À LA
GROSSESSE**

**ÂGE
GESTATIONNEL
MOYEN**

**ÂGE MOYEN DU
DIAGNOSTIC**
(source invs)



À SAVOIR !

CLASSIFICATION DU CANCER DU SEIN LIÉ À LA GROSSESSE :

Jusqu'à un an après
l'accouchement

LE CANCER DU SEIN
INFLAMMATOIRE
RESSEMBLE À UNE
MASTITÉ



TRAITEMENT



LA CHIRURGIE

est toujours possible avec les mêmes indications qu'en dehors de la grossesse.

LA RADIOTHÉRAPIE

est impossible pendant la grossesse, les patientes sont sous traitées s'il y a un grand délai entre la chirurgie et les rayons.

LA TECHNIQUE DU GANGLION SENTINELLE

permet d'éviter un curage axillaire extensif, on repère et on retire le ganglion drainant la lésion. Cette chirurgie est à éviter en deçà de 30 SA.

LA CHIMIOTHÉRAPIE

possible pendant la grossesse !
Sa toxicité pour le fœtus dépend : du terme de la grossesse, de la molécule, de son passage transplacentaire, de la dose.
Elle n'est pas possible au 1er trimestre. Au 2ème et 3ème trimestres les études sont rassurantes avec anthracyclines et les alkylants mais il reste des doutes sur le méthotrexate et peu de données pour les taxanes et l'herceptine.

L'ALLAITEMENT

est contre-indiqué pendant la chimiothérapie.



Lors de la consultation anténatale, première consultation du suivi de grossesse, penser à réaliser une palpation mammaire et à sensibiliser les femmes enceintes à s'autopalper les seins pendant la grossesse

Séverine Barandon - sage-femme