

# un cancer du sein chez la femme **enceinte** ou **allaitante**

## ÉPIDÉMIOLOGIE



de **30 à 35** ans

L'incidence du cancer du sein  
chez les femmes commence à  
**augmenter**

de **35 à 40** ans

**AUGMENTATION  
NETTE**



**500**  
femmes par  
an



**CONCERNÉES EN FRANCE PAR  
UN CANCER DU SEIN LIÉ À LA  
GROSSESSE**

**21**  
SA



**ÂGE  
GESTATIONNEL  
MOYEN**

**33**  
ANS

**ÂGE MOYEN DU  
DIAGNOSTIC**  
(source invs)



## À SAVOIR !

### CLASSIFICATION DU CANCER DU SEIN LIÉ À LA GROSSESSE :

Jusqu'à un an après  
l'accouchement

LE CANCER DU SEIN  
INFLAMMATOIRE  
RESSEMBLE À UNE  
MASTITÉ



Retrouvez le témoignage d'Élodie en intégralité dans la [vidéo capsule](#) !



## TRAITEMENT

### LA CHIRURGIE

est toujours possible avec les mêmes indications qu'en dehors de la grossesse.

### LA TECHNIQUE DU GANGLION SENTINELLE

permet d'éviter un curage axillaire extensif, on repère et on retire le ganglion drainant la lésion. Cette chirurgie est à éviter en deçà de 30 SA.

### L'ALLAITEMENT

est contre-indiqué pendant la chimiothérapie.

### LA RADIOTHÉRAPIE

est impossible pendant la grossesse, les patientes sont sous traitées s'il y a un grand délai entre la chirurgie et les rayons.

### LA CHIMIOTHÉRAPIE

possible pendant la grossesse ! Sa toxicité pour le fœtus dépend : du terme de la grossesse, de la molécule, de son passage transplacentaire, de la dose. Elle n'est pas possible au 1er trimestre. Au 2ème et 3ème trimestres les études sont rassurantes avec certaines chimiothérapies.



**Lors de la consultation anténatale, première consultation du suivi de grossesse, penser à réaliser une palpation mammaire et à sensibiliser les femmes enceintes à s'autopalper les seins pendant la grossesse**

**Séverine Barandon - sage-femme**