

un cancer du sein chez la femme **enceinte** ou **allaitante**

ÉPIDÉMIOLOGIE



de **30 à 35** ans

L'incidence du cancer du sein
chez les femmes commence à
augmenter

de **35 à 40** ans

**AUGMENTATION
NETTE**



500
femmes par
an



**CONCERNÉES EN FRANCE PAR
UN CANCER DU SEIN LIÉ À LA
GROSSESSE**

21
SA



**ÂGE
GESTATIONNEL
MOYEN**

33
ANS

**ÂGE MOYEN DU
DIAGNOSTIC**
(source invs)



À SAVOIR !

CLASSIFICATION DU CANCER DU SEIN LIÉ À LA GROSSESSE :

Jusqu'à un an après
l'accouchement

**LE CANCER DU SEIN
INFLAMMATOIRE
RESSEMBLE À UNE
MASTITE**



Retrouvez le témoignage d'Élodie en intégralité dans la [vidéo capsule](#) !



TRAITEMENT

LA CHIRURGIE

est toujours possible avec les mêmes indications qu'en dehors de la grossesse.

LA TECHNIQUE DU GANGLION SENTINELLE

permet d'éviter un curage axillaire extensif, on repère et on retire le ganglion drainant la lésion. Cette chirurgie est à éviter en deçà de 30 SA.

L'ALLAITEMENT

est contre-indiqué pendant la chimiothérapie.

LA RADIOTHÉRAPIE

est impossible pendant la grossesse, les patientes sont sous traitées s'il y a un grand délai entre la chirurgie et les rayons.

LA CHIMIOTHÉRAPIE

possible pendant la grossesse !
Sa toxicité pour le fœtus dépend : du terme de la grossesse, de la molécule, de son passage transplacentaire, de la dose. Elle n'est pas possible au 1er trimestre. Au 2ème et 3ème trimestres les études sont rassurantes avec certaines chimiothérapies.



Lors de la consultation anténatale, première consultation du suivi de grossesse, penser à réaliser une palpation mammaire et à sensibiliser les femmes enceintes à s'autopalper les seins pendant la grossesse

Séverine Barandon - sage-femme

Cette fiche a été pensée, produite par l'association **JEUNE.ROSE** et validée par son comité scientifique.

Avec le soutien institutionnel de

